

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dari 80 rekam medis yang diteliti dapat ditarik kesimpulan bahwa prevalensi tertinggi pasien asma anak usia 12-18 tahun di poli rawat jalan yaitu pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang (52,5%) dan perempuan sebanyak 38 orang (47,5%).
2. Jumlah penggunaan golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu golongan agonis beta-2 sebanyak 31 obat (38,75%).
3. Berdasarkan jenis obat yang digunakan pada kasus asma anak usia 12-18 tahun yang paling banyak digunakan adalah Salbutamol sebanyak 31 obat (38,75%) dan jenis obat yang jarang digunakan di Balkesmas Klaten adalah Prednisolon sebanyak 4 obat (5%).
4. Pola persepsian obat pada pasien asma anak usia 12-18 tahun di Balkesmas Klaten tahun 2017 sesuai dengan tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat dosis dan waspada efek samping. Rekam medik pada penderita penyakit asma anak di Balkesmas Klaten dapat dibuka atau dilihat pada kode asma tersendiri yaitu dengan kode asma J45.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pola persepan obat pada penderita asma anak dengan menggunakan metode yang lain seperti metode *purposive sampling*.
2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang interaksi obat asma anak dengan obat pendukung atau penyerta lain.
3. Lebih diperbanyak sosialisasi atau penyuluhan terhadap pasien asma beserta keluarganya terkait faktor resiko dan penatalaksanaan jika terjadi asma sehingga prevalensi pasien asma anak masuk rumah sakit berkurang.