

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik pemberian latihan gerak range of motion (ROM) yang dikombinasikan dengan berbagai terapi seperti (SEFT, kombinasi hipnotis, pengaruh terapi mirror, pengaruh rencana pemulangan dan terapi musik) bahwa intervensi tersebut terbukti memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik terapi tersebut haruslah diimplementasikan pada pasien stroke yang berada di rs bukan hanya untuk pengetahuan saja dan terapi tersebut dilakukan pada perawat yang mempunyai pengetahuan khusus dan keterampilan dalam melakukan teknik teknik ataupun tindakan terapis yang harus sesuai dengan standar prosedur sesuai dengan SOP yang berlaku sebagai alternatif terapidalam upaya untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil karya ilmiah *literature review* ini sebagai sumber informasi untuk melakukan penelitian terkait terapi dalam peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik .

2. Bagi institusi pendidikan

Study literatur ini dapat di jadikan sebagai landasan untuk pengembangan ilmu keperawatan yang sesuai terhadap pemberian intervensi kolaborasi untuk meningkatkan kekuatan otot pasien stroke non hemoragik.