

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan 5 jurnal yang sudah di dapatkan oleh penulis dan dilakukan analisis, bahwa plasenta previa merupakan salah satu penyebab perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam yang terjadi pada kehamilan diatas 28 minggu. Faktor yang perlu diperhatikan pada plasenta previa adalah usia ibu, paritas, riwayat operasi sectio caesaria, mioma uteri, polip endometrium, dan ibu perokok. Komplikasi pada plasenta previa adalah komplikasi perdarahan, robekan jalan lahir, retensio plasenta, interversio uteri, sakit kepala hebat, nyeri epigastrik, penglihatan kabur.

B. Saran

1. Diharapkan literature review ini dapat menambah referensi tentang asuhan keperawatan pada pasien post sectio cesarea atas indikasi plasenta previa untuk mendukung peneliti–peneliti berikutnya.
2. Diharapkan literature review ini sebagai masukan bagi profesi perawat agar meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya alternatif non farmakologi terhadap pasien post sectio cesarea atas indikasi plasenta previa.
3. Diharapkan menggunakan literature review ini sebagai referensi sehingga dapat mengembangkan konsep atau melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan pasien post sectio cesarea atas indikasi plasenta previa dengan cara yang mudah dan jumlah sampel yang lebih banyak.