

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Responden dalam penelitian ini memiliki rata-rata umur 45,7 tahun, mayoritas memiliki jenis kelamin laki-laki, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA, mayoritas responden bekerja yaitu, dan sebagian besar responden adalah suami/istri pasien skizofrenia.
2. Dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia sebagian besar dalam kategori tidak baik 46 responden (50,5%).
3. Pasien skizofrenia yang mengalami kekambuhan sebanyak 59 responden (64,8) dan sisanya 32 responden (35,2%) dalam kategori tidak pernah kambuh.
4. Ada hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia dengan $p \text{ value} = 0,007$; $\alpha = 0,05$ dengan kekuatan hubungan lemah.

B. Saran

1. Bagi perawat
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan perawat dapat menentukan aktivitas-aktivitasnya atau pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi pada pasien setelah pulang dari lembaga pelayanan kesehatan untuk mengurangi resiko kekambuhan perilaku kekerasan.
2. Bagi Rumah Sakit Jiwa
Berdasarkan hasil penelitian ini rumah sakit dapat mengadakan suatu program seperti home visit kepada keluarga pasien sehingga menurunkan resiko kekambuhan perilaku kekerasan.
3. Bagi Peneliti
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan dan mengontrol karakteristik pasien dan dapat memperhatikan faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku kekerasan.

4. Bagi Penelitian selanjutnya

Direkomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang berhubungan dengan kekambuhan perilaku kekerasan seperti kepatuhan minum obat dan dengan cakupan populasi yang lebih luas.