

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pengaruh Pembidaian terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Fraktur Ekstremitas Tertutup di IGD RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada 21 responden maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik responden yaitu rata-rata usia responden pada penelitian ini 40 tahun, paling banyak bejenis kelamin perempuan, paling banyak berpendidikan SMA dan status pekerjaan paling banyak bekerja.
2. Skala nyeri pada responden sebelum dilakukan tindakan pembidaian pada pasien dengan fraktur ekstremitas tertutup yaitu dengan rata-rata 6,19
3. Skala nyeri pada responden sesudah dilakukan tindakan pembidaian pada pasien dengan fraktur ekstremitas tertutup yaitu dengan rata-rata 3,90.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tindakan pembidaian terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur ekstremitas tertutup dengan nilai  $p\text{ value} = 0,000 < \alpha (0,05)$ .

#### **B. Saran**

1. Bagi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Peneliti berharap dapat memberikan gambaran kepada perawat IGD di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam memberikan penatalaksanaan pada pasien dengan fraktur ekstremitas tertutup. Selain itu dapat disusun penatalaksanaan yang dapat diterapkan di rumah sakit.

2. Bagi Profesi Perawat

Peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan perawat IGD kepada pasien dengan fraktur ekstremitas tertutup.

3. Bagi Pasien

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien dengan fraktur ekstremitas tertutup untuk mengurangi intensitas nyeri yang dialami oleh pasien.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya dan mempertimbangan faktor lainnya yang menurunkan nyeri dalam penelitian serta dapat menambahkan inovasi intervensi lainnya.

