

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Karakteristik pasien gagal ginjal kronik di RSUD Islam Klaten meliputi usia dengan rerata 50,13 tahun, jenis kelamin paling banyak laki-laki
2. Rata-rata tekanan darah pasien hemodialisa di RSUD Islam Klaten sistole 150,49 mmHg dan diastole 85,15 mmHg
3. Rata-rata berat badan pada pasien hemodialisa di RSUD Islam Klaten 65,08 kg
4. Lama menderita gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisa di RSUD Islam Klaten 30,87
5. Tidak ada Hubungan Lama Menderita GJK dengan Tekanan Darah dan Berat Badan pada Pasien pasien hemodialisa RSUD Islam Klaten dengan p value $> 0,05$

B. Saran

1. Bagi pasien gagal ginjal kronik
diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai tindakan hemodialisa dengan perubahan tekanan darah, dan dapat mengetahui gejala, kelainan dan efek samping pada tindakan hemodialisa seperti pembekuan darah, sumbatan, mual, muntah, pusing dan sakit kepala, serta mengetahui perbedaan tindakan hemodialisa 3 jam dan 4 jam.
2. Bagi Rumah Sakit
 1. Diharapkan dapat terus mengembangkan ilmu keperawatan dan memperluas wawasan tentang pelaksanaan tindakan hemodialisa misalnya dengan mengadakan atau melakukan pelatihan tindakan hemodialisa.
 2. Diharapkan setelah status digunakan segera dikembalikan ke bagian rekam medis.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 1. Agar kedepannya menganalisa variabel pengganggu seperti kadar BUN, durasi hemodialisa, IWL
 2. Menambahkan jumlah pasien dan sampel yang lebih banyak serta variabel lainnya yang juga diduga ada hubungan dengan perubahan tekanan darah, seperti faktor

kebiasaan, kecemasan, stress konsumsi obat-obatan dan kebiasaan hidup yang kurang sehat.

3. Menggunakan data primer untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kemungkinan terdapat data yang hilang saat penyimpanan