

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut

1. Karakteristik responden meliputi umur dengan rerata 27,52 tahun, pekerjaan mayoritas adalah ibu rumah tangga sebanyak 51,1%, pendidikan mayoritas SMA sebanyak 53,3%, kehamilan primigravida sebagian besar sebanyak 75,6%
2. Tingkat kecemasan pada pasien pre operasi *sectio caesarea* sebelum diberikan terapi murottal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten adalah kecemasan sedang sebanyak 48,9%.
3. Tingkat kecemasan pada pasien pre operasi *sectio caesarea* sesudah diberikan terapi murottal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten adalah kecemasan sedang sebanyak 37,8%, akan tetapi secara prosentase yang mengalami kecemasan sedang menurun, dan yang tidak mengalami kecemasan meningkat dari 11,1% menjadi 26,7%
4. Ada pengaruh terapi murottal terhadap tingkat kecemasan pada pasien pre operasi *sectio caesarea* di Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan p value = 0,001.

B. Saran

1. Bagi Pasien
Pasien pre operasi *sectio caesarea* dapat menerapkan terapie murottal / komplementer lain untuk mengurangi masalah kecemasan.
2. Bagi Perawat
Perawat dapat menggunakan terapi murottal sebagai intervensi dalam penanganan masalah kecemasan bagi ibu hamil yang akan melakukan operasi *sectio caesarea* sehingga dapat menurunkan kecemasan.
3. Bagi Rumah sakit
Rumah sakit membuat SOP keperawatan mandiri dalam mengatasi kecemasan dengan terapi murottal sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang syariah

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien pre operasi *sectio caesarea* serta melakukan analisis multivariat untuk mengetahui faktor yang paling berperan terhadap masalah kecemasan .