

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain adalah :

1. Karakteristik bayi dalam penelitian ini memiliki rerata Berat Badan Lahir $2802,95 \pm 467,607$ gram, rerata usia *gestasi* bayi adalah $38,008 \pm 1,445$ minggu, rerata kadar *bilirubin* bayi $15,9405 \pm 4,30321$ mg/dl dan mayoritas bayi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 106 responden (57,3%).
2. Karakteristik ibu dalam penelitian ini memiliki rerata usia $29,17 \pm 3,470$, mayoritas berpendidikan menengah (SMA/SMK) sebanyak 90 ibu (48,6%) dan tidak bekerja sebanyak 169 ibu (91,4%).
3. Kejadian *ikterik neonatorum* pada bayi yang dirawat di ruang NICU RSUD Islam Klaten sebanyak 134 bayi (72,4%).
4. Ada hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian *ikterik neonatorum* di ruang NICU RSUD Islam Klaten dengan nilai *p value* sebesar 0,000; $\alpha = 0,05$ dengan nilai *r* hitung 0,280.

B. Saran

1. Bagi pasien
Bayi *ikterik* dan BBLR perlu diberi nutrisi yang baik dengan pemberian ASI sesering mungkin dan ibu perlu mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi sehingga kandungan ASI lebih kaya gizi dan ASI lebih berkualitas.
2. Bagi perawat
Perawat memberikan edukasi kepada Ibu tentang perawatan *ikterik neonatorum* pada bayi. Perawat perlu memberikan *discharge planning* pada ibu terkait perawatan bayi *ikterik* dan memastikan ibu kembali kontrol sesuai jadwal.
3. Bagi rumah sakit
Rumah Sakit perlu meningkatkan pelayanan dengan pemberian asuhan keperawatan pada bayi *ikterik* sesuai intervensi yang sesuai.
4. Institusi pendidikan
Sebagai bahan masukan khasanah ilmu keperawatan dan menambah literatur tentang BBL dan *ikterik neonatorum*.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dan meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi *ikterik* seperti faktor ASI dan faktor Ibu