

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari pada kasus 1 An. A dan An. R dengan diagnosa medis diare cair akut dengan dehidrasi ringan sampai sedang di Ruang Multazam Rumah Sakit Islam Klaten, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pengkajian**

Pengkajian dilakukan pada tanggal 4 juni 2018 untuk kasus 1 yaitu An. A jenis kelamin perempuan usia 1 tahun. Hasil autoanamnesa yang di peroleh yaitu keluarga pasien mengatakan sudah bab cair 4x sehari dan demam, badan pasien lemas dan rewel. Dengan dehidrasi ringan sampai sedang .

Hasil pengkajian dilakukan pada tanggal 9 juni 2018 untuk kasus 2 yaitu An. R jenis kelamin laki-laki usia 1 tahun. Hasil autoanamnesa yang di peroleh yaitu Keluarga pasien mengatakan pasien diare lebih dari 5x sehari dan diikuti dengan dehidrasi dan demam.

##### **2. Diagnosa Keperawatan**

Diagnose keperawatan yang angkat adalah Diare b.dinflmasi usus dan hipertermi b.d proses penyakit. Tetapi ada beberapa diagnose yang bisa ditegakan antara lain yaitu kekurangan volume cairan dan ketidakseimbangan kebutuhan nutrisi

### 3. Perencanaan Keperawatan

Rencana tindakan keperawatan yang disusun dalam melakukan asuhan keperawatan kepada kedua kasus sesuai dengan diagnosa keperawatan. Selain itu tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan sudah sesuai dari intervensi yang disusun berdasarkan NIC disesuaikan dengan masalah pasien serta sudah berpedoman pada prinsip ONEK (Observasi, Nursing, Edukasi, Kolaborasi). Perencanaan yang dilakukan pada partisipan 1 dan 2 adalah fever treatment dan diarrhea management

### 4. Implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan yang dilakukan selama 3 hari untuk kedua kasus. Tindakan yang diberikan yaitu tindakan mandiri dan kolaboratif. Serta merujuk pada intervensi keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya.ada beberapa intervensi yang belum dilakukan oleh perawata yaitu mengitung balance cairan dan memberikan kompres hangat

### 5. Evaluasi keperawatan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selam 3x24 jam untuk diagnose pada kasus 1 masalah teratasi sebagian. Sedangkan pada kasus 2 masalah juga teratasi sebagian, dikarenakan masih perlu observasi KU dan *vital sign* selain itu harus kolaborasi dengan dokter apakah tindakan masih dilanjutkan.

## **B. Saran**

### 1. Bagi institusi pendidikan

Bagi institusi pendidikan sebaiknya memberikan arahan secara optimal dalam proses pemberian asuhan keperawatan anak khususnya diare.

### 2. Bagi rumah sakit

Bagi rumah sakit sebaiknya mempertahankan mutu pelayanan yang baik agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat..

### 3. Bagi keluarga pasien

Bagi keluarga pasien orang di rumah sebaiknya mampu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

### 4. Bagi perawat

Bagi perawat,perawat sebaiknya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan proses keperawatan dan mendokumentasikanya secara lengkap sehingga terwujud pelayanan yang professional.

### 5. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti sebaiknya lebih memperdalam pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada anak khususnya diare.