

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Asuhan kebidanan pada Ny. D di BPM Susi Hersaptiti Trucuk Klaten dilaksanakan dari kehamilan usia 28 minggu, bersalin, bayi baru lahir dan nifas 6 minggu dan dilakukan sesuai dengan 7 langkah Varney serta catatan perkembangan dengan model SOAP yang terdiri dari subyektif, obyektif, analisa, dan penatalaksanaan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kehamilan didapatkan ukuran Lila Ny.D adalah 22 cm. Padahal ukuran Lila yang didapat pada ibu hamil normal adalah 23,5 cm.
2. Pada kehamilan Tinggi Fundus Uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan, usia kehamilan 28 minggu TFU 22 cm, usia kehamilan 32 minggu TFU 23 cm, usia kehamilan 33 minggu 5 hari TFU 23 cm, usia kehamilan 35 minggu 6 hari TFU 27 cm, dan usia kehamilan 38 minggu TFU 26 cm, seharusnya TFU dihitung tiap pertambahan umur kehamilan (cm) kurang lebih naik 2 cm.
3. Pada persalinan saat bidan melakukan pertolongan persalinan tidak menggunakan APD lengkap, hanya menggunakan handscoon dan celemek, seharusnya saat melakukan pertolongan persalinan bidan menggunakan APD lengkap.

4. Pada bayi baru lahir, saat pemberian Hb0 waktunya tidak sesuai bidan memberikan imunisasi Hb0 saat bayi berumur 6 jam, seharusnya imunisasi Hb0 diberikan 1-2 jam setelah pemberian vit K.
5. Pada nifas waktu pemberian vitamin A tidak sesuai karena terjadi selisih waktu 15 menit. Vitamin A diberikan 2 kali, vitamin A pertama diberikan segera setelah melahirkan , vitamin A yang kedua diberikan 24 jam setelah pemberian vitamin A yang pertama pada jam yang sama.
6. Pada nifas saat memberikan KIE KB waktunya tidak tepat, peneliti memberikan KIE KB pada 6 minggu post partum (42 hari), seharusnya KIE KB diberikan sedini mungkin sebelum 6 minggu (42 hari) post partum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka disarankan beberapa hal berikut:

### 1. Bagi Bidan

Wajib memberikan asuhan dan terapi serta pemeriksaan laboratorium selama kehamilan, Memberikan Asuhan Sayang Ibu dan anak selama Persalinan serta Melakukan Pertolongan APN 58 langkah, Wajib memberikan terapi pada ibu nifas Amoxillin 10 Tablet, Asam Mefenamat 10 Tablet , Tablet Fe 10 tablet , Vit A 2 kapsul,Wajib memberikan informasi dan KIE KB secara dini sebelum waktu masa nifas habis, Wajib memberikan asuhan dan Imunisasi pada bayi Seperti HB-0 , BCG, Polio,

Pentavalen, Campak. Serta Diharapkan mampu mempertahankan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

2. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Sebagai sumber pengetahuan untuk kemajuan perkembangan ilmu kesehatan dan sebagai referensi pada teori dan keadaan di lahan.
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas, Kb, bayi baru lahir.

3. Bagi Klien

Diharapkan klien memperhatikan setiap asuhan yang diberikan sejak hamil dengan adanya kesenjangan pada cek Hb dianjurkan untuk kehamilan selanjutnya untuk cek Hb di Trimester I dan Trimester III, Kesenjangan Kedua pada TFU karena kurangnya asupan nutrisi dan untuk kehamilan selanjutnya dianjurkan untuk makan menu seimbang serta cukup protein karbohidrat dan lemak ,bersalin tidak ada kesenjangan , nifas tidak ada kesenjangan dan klien mampu merawat serta memantau pertumbuhan dan perkembangan bayinya.